


LINCOSAMIDI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



Malattie Infettive - Viale

SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA ANTIMICROBICA NELL'ADULTO E NEL BAMBINO IN OSPEDALE

CLINDAMICINA

PRINCIPIO ATTIVO	Clindamicina cloridrato; Clindamicina fosfato.
Nome commerciale	Dalacin-C, Clindamicina fosfato Hikma.
Categoria farmacologica	Antibatterici Lincosamidici
Dosaggi disponibili	- capsule da 150 mg; - soluzione iniettabile 600mg/4 ml.
Via di somministrazione	- orale; - intramuscolare profonda; - fleboclisi.
Dose e Tempo somministrazione con range	<p>Bambini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 8 a 20 mg/kg/die suddivisi in 3 o 4 somministrazioni a seconda della gravità dell'infezione; - Infezioni gravissime: 25-40 mg/Kg/die suddivisi in 3-4 somministrazioni. <p>Adulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600-1200 mg/die suddivisi in 3 o 4 somministrazioni a seconda della gravità dell'infezione. Nella terapia di mantenimento delle infezioni ginecologiche e pelviche, dopo trattamento per via endovenosa, somministrare 450 mg ogni 6 ore per 10-14 giorni; - <u>Infezioni gravissime</u>, particolarmente quelle dovute ad accertato o sospetto <i>Bacteroides fragilis</i>, <i>Peptococchi</i> o <i>Clostridi</i> diversi dai <i>Clostridium perfringens</i>: 1200-2700 mg/die suddivisi in due, tre o quattro somministrazioni. <p>Questi dosaggi, se il caso lo richiede, possono essere aumentati fino a 4800 mg/die da somministrare per flebo in quelle infezioni che possono compromettere la vita del paziente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Toxoplasmosi cerebrale in pazienti immunocompromessi</u>: 600-1200 mg ogni 6 ore per due settimane, seguiti da 300-600 mg ogni 6 ore fino a completare il ciclo terapeutico di 8-10 settimane. <p>Quando la clindamicina viene associata alla pirimetamina la dose di quest'ultima è di 25-75 mg per via orale per 8-10 settimane. Con le dosi più elevate di pirimetamina si consiglia di somministrare 10-20 mg/die di acido folinico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Polmonite da <i>Pneumocystis jiroveci</i> in pazienti immunocompromessi</u>: 300-450 mg ogni 6 ore per 21 giorni associati a 15-30 mg di primachina somministrata per via orale una volta al giorno per 21 giorni; - in caso di infezioni da streptococco beta-emolitico, è raccomandabile continuare il trattamento per almeno 10 giorni per diminuire la probabilità di febbre reumatica o glomerulo nefrite. <p>Clindamicina Fosfato Hikma non deve essere iniettato per via endovenosa sotto forma di bolo non diluito, ma deve essere infuso in un periodo di almeno 10-60 minuti. Il farmaco può essere somministrato per la prima volta mediante fleboclisi rapida e successivamente mediante fleboclisi lenta.</p>

	Non sono necessarie modifiche della posologia in pazienti anziani, con <u>insufficienza renale o sottoposti a dialisi</u> , usare cautela nei pazienti affetti da grave insufficienza epatica
Ricostituzione e diluizione del farmaco	Il farmaco è in soluzione liquida, da NON somm.re in bolo ma ulteriormente diluito in almeno 100ml. (fino ad una concentrazione massima di 18mg/ml)
Conservazione e Stabilità del farmaco	Confezione integra: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Stabilità del prodotto ricostituito: Clindamicina Fosfato è risultata fisicamente e chimicamente compatibile per almeno 24 ore, in soluzioni iniettabili di destrosio al 5% e cloruro di sodio 0,9% contenente i seguenti antibiotici nelle concentrazioni comunemente impiegate: amikacina, aztreonam, cefamandolo, cefazolina, cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, ceftizoxima, gentamicina, netilmicina, piperacillina e tobramicina. La compatibilità e la durata di stabilità delle miscele di farmaci variano in funzione della concentrazione e di altre condizioni.
Incompatibilità	I seguenti farmaci sono fisicamente incompatibili con la <u>clindamicina fosfato</u> : ampicillina, sodio difenilidantoina, barbiturici, aminofillina, magnesio solfato e gluconato di calcio.
Incompatibilità alimentari	
Interazioni	<ul style="list-style-type: none"> - <u>etere, tubo curarina, pancuronio</u>: La clindamicina può potenziare l'effetto di blocco neuromuscolare; - <u>eritromicina</u>: dimostrato antagonismo terapeutico; - <u>lincomicina</u>: dimostrata reattività crociata.
Controindicazioni	Clindamicina è controindicato in caso di: - ipersensibilità al principio attivo, alla lincomicina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Gravidanza. Allattamento.
Gravidanza	Risk Factor B. Non essendone accertata la sicurezza d'impiego il prodotto è controindicato nelle donne in gravidanza.
Allattamento	Non essendone accertata la sicurezza d'impiego il prodotto è controindicato durante l'allattamento.
Reazioni avverse comuni	<ul style="list-style-type: none"> - Patologie gastrointestinali: dolore addominale, diarrea; - Patologie epato-biliari: alterazione dei parametri di funzionalità epatica.
Parametri da monitorare	- Durante una terapia prolungata si devono effettuare esami periodici della funzionalità epatica e renale ed esami emocromocitometrici.
Info pazienti	- Per evitare possibili irritazioni esofagee, le capsule di DALACIN C devono essere ingerite con un bicchiere d'acqua.
Avvertenze	<ul style="list-style-type: none"> - sono stati segnalati casi di diarrea associata a Clostridium difficile, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale. Il trattamento con gli antibiotici altera la normale flora del colon e porta a una crescita eccessiva di C. difficile; - clindamicina deve essere prescritta con cautela ad individui con anamnesi positiva per malattie gastro-intestinali e particolarmente coliti ed agli individui atopici; - Il medicinale contiene lattosio; non è quindi adatto per i soggetti con deficit di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio; - L'impiego della Clindamicina deve essere riservato ai pazienti allergici alla penicillina o a pazienti per i quali, a giudizio del Medico, la penicillina non sia indicata; - Per la presenza di alcool benzilico, il prodotto non deve essere somministrato ai bambini al di sotto dei due anni; - Non somministrare più di una singola fiala da 600mg. per via intramuscolare; - utilizzare la rotazione dei siti di iniezione; - Non somministrare clindamicina in bolo endovenoso.